

技术服务 | 冬季家禽养护管理

苏州市吴江区农业农村局 2024年12月11日 17:00 江苏

冬季气候寒冷，昼夜及舍内外温差大，易导致家禽机体抵抗力下降、生长迟缓、生产性能下降、发病率和死亡率升高。因此广大养殖户应注意以下几个方面的问题：

1. 禽舍维护与加固

全面巡查禽舍以及水电等基础设施与设备，并予以加固。着重排查老旧禽舍存在的隐患，若有必要，需及时转移禽只，防止严重坍塌事故的发生。

2. 加强保温措施

温度是家禽生长的关键要素，入冬前做好防风抗寒准备，入冬后适当调整纵向通风量，减少冷空气进入，维持适宜的环境温度。鸡不同生长阶段理想温度各异，且需保持相对稳定，冬季通常难以达标。因此，要着重加强育雏期保温工作，防止贼风与穿堂风侵袭。可通过关闭门窗、加挂塑料布或彩条布、供应温水等方式防寒保温。同时，减少肉鸡成鸡阶段室外运动量。



3.适当调整饲料配比

冬季气候恶劣，家禽抵抗力相对薄弱，所以提升饲料质量至关重要。雏鸡阶段适度提高饲料蛋白含量，育成期增加能量比例并适当增量投喂，以抵御风寒消耗。如在原来的基础上补加10%~20%的玉米，并根据体重大小适当增加喂料量。蛋鸡饲料中增添2%~4%的干酵母，可降低蛋鸡的发病概率，增添6%蚕蛹粉，可以显著提升产蛋量。



4.加强饲养管理

及时清理禽舍粪便与杂物，定期对鸡舍、用具进行彻底消毒，保持舍内清洁干燥，维持适中饲养密度，保障舍内氧气充足。注重通风换气，在中午

天气良好时开窗通风，以减少鸡舍中粉尘，降低舍内有害气体的浓度，满足鸡群所需温度和空气新鲜度。蛋鸡对光照要求较高，需严格设定光照时段，每日早晚开灯 2 次，保证 15 – 16 小时光照时长，阴天与雨雪天气适当延长光照时间，但避免整日开灯与随意更改光照时长。



5.加强疫病防控

冬季疾病风险颇高，要密切监测抗体水平与禽群动态，有效防范禽流感、传染性支气管炎、新城疫等冬季常见疾病。强化生物安全措施，做好圈舍及周边环境卫生与消毒工作，定期清扫粪便与消毒，选用过氧乙酸、百毒杀等消毒剂，每周进行1-2次带禽消毒。对病死禽只及时无害化处理，防止疫病传播。依据家禽品种与当地疫病流行状况制定合理免疫程序，接种禽流感、新城疫等疫苗。同时，密切观察家禽采食、饮水、精神状态等，发现异常及时隔离诊治，防止疫病扩散，减少损失。

拟稿：吕振环

审核：盛祖勋

签发：吴惠华、沈利明