

技术服务 | 因苗施策抓春管 促弱转壮保丰收

苏州市吴江区农业农村局 2025年03月04日 17:54 江苏

今年全区麦菜种植面积**22.86万亩**

其中小麦面积**22.5万亩**

比上年增**0.6万亩**

油菜面积**0.36万亩**

比上年增**0.02万亩**

早播小麦已开始拔节

油菜开始抽薹

针对现阶段苗情特点，要围绕“促弱转壮、稳穗争粒增重”的总体思路，重点做好麦菜田间管理，落实好肥水管理、病虫草防治、清沟理墒等关键措施，促进苗情转化升级，确保麦菜春发稳长。



一是晚播小麦增施返青肥

对目前小麦叶龄较小、苗数不足、基苗肥不足的田块，要结合近期降雨趁墒适施返青接力肥，兼顾促平衡，促进分蘖发苗，促进个体生长，争取小分蘖和高节位分蘖成穗，实现“稳穗增穗”，一般每亩施尿素7.5~10公斤。



二是重点施好小麦拔节孕穗肥

施好小麦拔节孕穗肥有利于培育壮秆，减少小花退化，增加每穗粒数，增加功能叶面积并延长功能期，提高千粒重。拔节肥一般掌握在小麦基部第二节间伸长1cm时施用；每亩施尿素10~12.5公斤。若群体过大、叶片发披、叶色深绿的麦田要推迟施用、少施或不施。



孕穗肥可在小麦剑叶（最后1叶）露出一半时，适量增施，一般亩追施尿素5~7.5公斤；也可结合防病治虫喷药时，增加喷施叶面肥，防止早衰，实

现“增粒增重”。

三是普施重施油菜抽薹肥

抽薹肥是油菜一生的关键肥料，抽薹肥施用时间掌握在薹高20~30cm时，一般在2月下旬至3月初；施用数量为每亩施尿素12.5~15公斤，群体小、叶色淡的油菜田，早施、重施抽薹肥，促进春发转壮。

四是全面清理加深田间沟系

农谚“寸麦不怕尺水，尺麦但怕寸水”，春季雨水偏多，渍害威胁大，要全面清理加深田间沟系，疏通田内外沟系，做到沟沟相通，排水畅通，田面不积水，切实减轻夏熟作物渍害。



五是因地制宜做好春季化除

根据田间草害发生情况，特别是尚未用药化除、化除效果不理想的小麦田块，在小麦拔节前，日平均气温上升到5~8℃以上时，及时开展麦田杂草春季防除工作，见草除草突出“早”和“准”，要关注天气，抢抓晴天用药，防止发生低温冻药害。



来源：农业技术服务中心

审核：周君

签发：吴惠华、穆兰芳

