

技术服务 | 梅雨期水产养殖生产管理指导意见

苏州市吴江区农业农村局 2026年6月18日 18:04 江苏

一年一度的“梅姑娘”，将于今天夜里在苏州“上岗”，伴随着连绵的阴雨、黏腻的湿热以及不时出现的短时强降水，让水产养殖生产管理面临更多考验，请养殖主体注意加强梅雨期养殖生产管理：



01 稳定水质



梅雨期池塘水质极易变差，水体溶氧易不足。故梅雨季节增氧设施要多开、勤开，同时注意水质调节管理，保持藻相、菌相稳定。

02 养好水草



梅雨季节光照减少，光合作用受阻，池塘水草易老化、漂浮、挂脏甚至衰败。虾蟹养殖关键在草，须做好水草管理，保持池塘水草覆盖面积占池塘面积的40%–60%。

结合天气和巡塘情况掌握水产品吃食状况，灵活调整投喂时间、频次以及数量。可定期在饲料中添加适当的益生菌或多肽、多糖等，增强水产品免疫力，同时谨防饲料霉变。



梅雨期常与短时强降水相伴。强降雨的极端天气对水产养殖影响较大：

1.扰乱池塘水体原有的稳定状态，加剧了水产品的应激反应，进而导致水产品免疫力下降，进一步增加了水产病害发生与流行的趋势。

2.水位升高增加水产品逃逸风险，从而对水产养殖业的丰产丰收造成威胁。

所以，梅雨期须做好“四防”：一防内涝、漫塘；二防缺氧浮头；三防水产品应激；四防饲料霉变。

梅雨期养殖主体要注意防范短时强降水，具体意见如下：

强降雨之前

1.随时关注天气预报，及时掌握天气变化情况，及早采取相关措施，从而减少灾害性天气对水产养殖业造成的损失；

2.及时加固池埂和防逃设施，同时疏通排水沟渠，检查养殖设施和用

电设备状态。

强降雨过程中

- 1.池埂湿滑，生产作业注意自身安全；
- 2.适时开启增氧机，保证池塘溶解氧含量，减缓微生物死亡，稳定水体环境；
- 3.少投或者不投喂饵料，防止水产品消化时机能失调，加重应激反应。

强降雨过后

- 1.及时处理死鱼、病鱼和杂乱水草，防止其进一步腐烂污染水质；
- 2.对有水产品逃逸或大量死亡的池塘，及时摸清数量并补放苗种；
- 3.及时调控水质，改善并净化水体环境。

拟稿：顾玲玲

审核：周建忠

签发：翁春强