

技术服务 | 七月果园管理技术要点

苏州市吴江区农业农村局 2026年7月3日 17:35 江苏

七月吴江天气复杂多变，果园易遭遇旱涝急转、高温暴晒双重胁迫。前期梅雨季持续阴雨天气，造成果园土壤水分饱和、果树根系通气受阻、活力衰退，同时田间病菌大量滋生、基数累积偏高，因此七月中上旬果园管理核心需聚焦排湿降渍、防病壮树、养根保树。当前桃树处于晚熟品种膨大关键期、早中熟品种采后恢复期，梨树进入果实膨大末期、临近采收阶段，葡萄迎来转色上色、成熟提质核心期，各品类果树管理均直接决定当年果品产量与果品品质。结合吴江本地气候特征、物候特点，现将七月果园精细化管理技术要点整理如下，为广大种植户提供技术参考。

树体管理

通风透光，科学夏剪、采后复壮

梅雨季高温高湿环境易导致果树枝条徒长、郁闭遮光，雨后需及时开展夏季修剪，疏除过密枝、下垂枝，打通树冠通风透光通道。各类果树采前做好夏剪，改善通风透光，成熟前适时拆袋促着色；已经采完的树要及时修剪，把徒长枝回缩、直立枝压平，为明年花芽分化打基础。像葡萄转色期可以摘掉果穗附近的老叶、适当揭膜，帮助上色，避雨棚揭膜通风需循序渐进，优先掀开棚体两侧薄膜通风散湿，严禁一次性全开，避免环境骤变引发果实日灼、裂果。

土肥水

控氮增钾，均衡水肥、稳墒保树

七月肥水记住控氮、增钾、补钙、稳水。根部追高钾肥，采后补一次恢复肥，叶面喷磷酸二氢钾加钙肥，十天左右一次。梅雨季后养分流失多，先补一次养根肥再追肥。雨后一定要清沟排水，果园不能积水；高温天早晚小水勤浇，禁止正午高温时段大水漫灌。树盘覆草或留生草可以保墒降温。土壤湿度要稳定，不能忽干忽湿，转晴后浅耕松土，让水分慢慢散。

病虫害防控

绿色防控，严守采收安全间隔期

剪下来的病虫枝、落地果要集中处理，挂好糖醋液和诱虫灯。梅雨后湿度大，重点清理病叶病果带出园外。桃树注意天牛和食心虫，梨树防好轮纹病，葡萄重点防霜霉、白腐这些病害，雨后抓紧打保护剂。用药选低毒高效的，轮换使用，采前十五天停药。梅雨期耽误打药的，解禁后第一次用药浓度稍微低一点。

防灾减灾

前置防范，筑牢高温台风防线

吴江七月下旬至八月为台风、强对流天气高发窗口期，需提前排查隐患、前置防控措施，做好防灾减灾准备。逐园排查加固葡萄避雨棚、果树支架、固定拉线等设施，及时更换破损、老化棚膜，严防大风、暴雨导致棚体坍塌、设施损毁。果园四周排水沟再清一遍，防倒灌闷棚。连续35℃以上高温段，对向阳西晒果实、幼树主干采取涂白、遮阳覆盖等防护措施，有效规避果实、枝干日灼损伤。高温天打药选一早一晚，复配药别乱混，防药害。

拟稿：蚕桑园艺站

审核：顾理流