

技术服务 | 水稻防灾减损技术措施

苏州市吴江区农业农村局 2026年8月17日 17:32 江苏

受第13号台风“白海豚”强降雨影响，吴江区部分水稻田出现积水情况。少数水稻田面临积水烂根、病虫害暴发等问题，需因苗分类处置，降低受灾损失。

一是排水降渍，恢复生长

长期淹水会造成烂根死苗，需抓紧疏浚农田沟系，迅速降低田间积水。如遇高温晴热天气，切忌一次性排干，应分次排水，先使植株上部露出水面，田间保留3-5厘米浅水层，防止高强度叶面蒸发导致植株生理失水而青枯死苗。幼穗分化前期的水稻田，要结合“搁田”进行间歇灌溉，干湿交替，适当延长露田时间，控蘖促根，提高水稻后期灾害抵御能力。



二是科学补救，降低损失

短期淹水田块，退水后3-5天田面干爽时，可实施根外追肥和叶面喷肥相结合，养根保叶，促进植株恢复生长。长时间受淹田块，稻株仍为绿色，有心叶抽出的，可喷施磷酸二氢钾、芸苔素内酯等；由于受淹时间较长，水稻基部

节间明显拉长，应减少穗肥施用量，避免后期倒伏。



三是加强监测，防治病虫

持续的大风强降雨天气，十分有利于水稻“两迁”害虫、稻瘟病、纹枯病等病虫害集中危害，要密切关注当地农业技术部门发布的病虫害防治技术意见，根据病虫发生情况抢抓防治关键窗口，提高防控的针对性和精准性，最大限度降低病虫为害损失。



四是清茬整地，做好备耕

对于根系腐烂、心叶已死、轻拔稻株容易拔断且分蘖节变软发臭等地块，

要及时清理田内稻株、腐烂残体和漂杂物，同时抢晴进行深翻晒田散墒，改善土壤透气性，打好下茬农作物种植基础。

来源：农业技术服务中心

审核：周君

签发：翁春强、穆兰芳

