

技术服务 | 九月果园管理技术要点

苏州市吴江区农业农村局 2026年9月4日 18:22 江苏



九月吴江暑热渐消、昼夜温差拉大，但白天“秋老虎”余威仍在，降水分布不均，果园管理进入承上启下的关键阶段。本月多数梨树已完成采收进入采后恢复期，桃树晚熟品种迎来采收高峰、采后早熟品种进入养分积累期，中晚熟葡萄处于上色成熟直至采收的关键窗口，部分秋延后品种仍需精细管护。九月管理重心需从“促果膨大”转向“养根壮树、秋施基肥、防病保叶”，为明年花芽分化和来年丰产奠定坚实基础。结合吴江本地气候特征、物候特点，现将九月果园精细化管理技术要点整理如下，为广大种植户提供技术参考。

树体管理

采后修剪，通风透光、蓄养树势

九月气温回落，果树秋梢渐停长，是改善树体结构的关键期。已采完果的桃、梨树，要及时疏除过密枝、背上直立枝、病虫枝和细弱枝，回缩过长结果枝，保持树冠通风透光，促进剩余叶片光合作用，为根系生长和花芽分化积累营养。晚熟桃、葡萄上色成熟期，继续摘除果穗附近老叶、病叶，清理果实周围遮挡叶片，促进均匀上色；果园郁闭度高的园块可适当撩开裙膜通风，如需调整顶膜务必循序渐进，不建议大面积撤除顶膜，防止雨水直淋诱发病害以及环境骤变引起裂果、日灼。采果时坚持“轻摘轻放”，避免损伤果枝和叶片，采后及时对结果枝进行短截更新。

土肥水

秋施基肥，养根护根、调墒控水

九月是果树根系的第二次生长高峰，也是秋施基肥的黄金期，要牢记“秋施金、冬施银”的原则。早中熟品种采后尽早施入基肥，以充分腐熟的有机肥为主，配合平衡型复合肥和微量元素肥，施肥深度因树种而异，梨等深根树40厘米左右，桃、葡萄等浅根树15-30厘米；可采用环状沟施、条状沟施或穴施，沟/穴位于树冠投影外缘附近；晚熟品种可在采果后或采收前一周结合灌水施入低氮型速效复合肥，促进果实后期膨大增甜。采后结合叶面喷施0.3% 磷酸二氢钾 + 0.2% 尿素，连喷两次，间隔十天，延缓叶片衰老，提高光合效能。水分管理上，采收前适度控水提升果实糖度和耐储性，采收后及时补水恢复树势；九月仍处于暴雨台风易发期，雨后务必清沟排水，严防沤根，果园不能积水。高温干燥天气早晚小水勤浇，保持土壤湿度稳定，防止忽干忽湿引发裂果。

病虫害防控

绿色防控，采后清园、保叶防早衰

九月昼夜温差加大、田间湿度仍偏高，是梨网蝽、桃蛀螟、炭疽病、霜霉病等病虫害的发生高峰。采前果园要严格按照农药标签安全间隔期执行，悬挂黄板诱杀蚜虫等趋黄性害虫，利用性信息素诱捕器诱杀梨小食心虫、桔小实蝇成虫，果实套袋园及时检查破损果袋。已采果园要立即开展清园，将剪下的病虫枝、烂果、落地果、病叶全部清理带出园外集中销毁，降低越冬病虫基数。采后保叶是当前核心工作，梨树重点防治梨网蝽和黑星病，桃树防治真菌性穿孔病和流胶病，葡萄重点防好霜霉病、白腐病和炭疽病，可选用低毒高效的杀菌剂、杀虫剂轮换使用，做到“治虫防病、护叶养根”，防止叶片提前脱落影响树体营养积累。

防灾减灾

未雨绸缪，防台防涝、减少裂果日灼

吴江九月仍处台风、强对流天气多发期，需持续绷紧防灾减灾这根弦。逐园排查加固避雨棚、果树支架、拉线等设施，及时更换破损棚膜、压紧棚边，严防大风暴雨造成棚体损毁、树体倒伏。果园四周及行间排水沟提前深挖疏通，防止强降雨导致园区积水内涝。成熟期果树若遇久旱后突降暴雨，可能因土壤水分剧变引发裂果，可提前在树盘覆盖稻草、秸秆等，缓冲土壤水分剧烈波动；持续高温干旱天气，对果实和幼树主干采取遮阳网覆盖，防范日灼伤害。台风过境后，及时扶正倒伏树体，清理断枝落叶，全园喷施一次保护性杀菌剂，防止伤口感染。

九月是果树管理承前启后的关键月，抓好采后恢复、秋施基肥、病虫防控和防灾应急，既保障当前果品顺利采收上市，更为果树安全越冬和明年丰产优质打下坚实基础。广大种植户要密切关注天气变化，合理安排农事，确保各项管理措施落实到位。

拟稿：蚕桑园艺站

审核：顾理流

签发：翁春强、陈惠锋

