



技术服务 | 高温季节畜禽养殖管理及动物防疫要点

苏州市吴江区农业农村局 2026年7月31日 17:03 江苏

当前苏州正值持续高温天气，叠加短时暴雨、大风等强对流天气，高温高湿环境大幅增加了养殖疫病风险：畜禽热应激加重、免疫力下降；蚊蝇蠓等媒介生物大量滋生，虫媒病多发；饲料易霉变、饮水易污染；病死畜禽腐败速度加快，无害化处理压力陡增。为保障畜禽养殖安全与公共卫生安全，结合高温天气特点，小编梳理了高温季节养殖管控技术要点供广大养殖户参考。



强化饲养管理 降低热应激风险

- 一是保障清凉饮水：高温季节畜禽饮水量大幅攀升，务必全天候供应充足、清洁、清凉的饮用水，可在饮水中适量添加电解多维、维生素C、氯化钾等，帮助畜禽缓解热应激。
- 二是调整饲喂方式：避开正午高温时段，实行“早喂、晚喂、夜间加喂”原则，少量勤添，适当增加青绿多汁饲料和湿拌料比例，提高畜禽采食积极性。
- 三是减少人为应激：高温正午时段严禁转群、分栏、长途运输、免疫接种等应激操作，必要作业安排在清晨或傍晚凉爽时段进行。

一是遮阳隔热：圈舍顶部搭建遮阳网、铺设隔热材料，周边种植藤蔓植物，减少阳光直射，可有效降低舍温3—5℃。

二是强化通风：提前检修风机、湿帘、排气扇等通风降温设备，确保高温时段正常运行。封闭式圈舍可采用“风机+湿帘”负压通风模式。

三是合理降低密度：适当降低饲养密度至正常水平的60%—80%，减少群体积热效应，为畜禽营造舒适的生存空间。



一是增加消毒频次：高温高湿季节，圈舍消毒每周不少于3—4次，场区环境每周至少消毒2次，消毒药剂交叉轮换使用，避免产生耐药性。

二是聚焦重点区域：对圈舍内部、场区道路、排污沟渠、运输车辆、饲喂器具等进行全覆盖消杀，不留卫生死角。

三是灭蚊灭蝇灭鼠：及时清除场区积水、杂草和垃圾，填平低洼地带，定期喷洒合规杀虫剂，封堵鼠洞，从源头消除媒介生物孳生环境。



严格病死畜禽无害化处理

杜绝安全隐患

严守“四不准一处理”：病死畜禽不准宰杀、不准食用、不准出售、不准转运，必须进行无害化处理。严禁随意丢弃病死畜禽尸体，防止污染环境和传播疫病。

强化巡查排查：加大养殖场户和重点区域的巡查力度，发现病死畜禽及时收集、规范处置，严防病死畜禽及其产品流入市场。

拟稿：史俊杰

审核：盛祖勋

签发：翁春强、沈利明